

BESTAREN®

Декскетопрофен

БЪРЗО

И ЕФЕКТИВНО ОБЛЕКЧЕНИЕ НА БОЛКАТА^{2,4}

- ▶ Мощно противовъзпалително действие²
- ▶ Редуцирана честота на нежелани реакции²




В НОВА
ОПАКОВКА

Бестарен® ти дава бързо и ефективно облекчение при болка в гърба, кръста, ставите, при менструация и зъбобол



болки в гърба



болки в кръста



болки в ставите



при менструация



зъбобол



БЪРЗО


И ЕФЕКТИВНО ДЕЙСТВИЕ^{2,4}

- ▶ Декскетопрофен трометамол е водноразтворима сол на дясновъртящия енантиомер на кетопрофен. Той е един от най-мощните (ин витро) инхибитори на простагландиновия синтез, но само дясновъртящият му енантиомер притежава аналгетични и противовъзпалителни свойства.⁷ Лявовъртящият енантиомер не потиска COX-2, но ин витро изследвания при плъхове, посочват, че притежава улцерогенни качества.³
- ▶ Относителната бионаличност на активния изомер при перорално приложение на трометамоловата сол е еднаква с тази на рацемичен кетопрофен в два пъти по-висока доза, но времето за достигане на пикова плазмена концентрация (t max) е съкратено от 0.5 до 3 часа (в зависимост от лекарствената форма) на **15 до 60 минути**.^{3,7,9,10}

Без значение от специалността на лекарите използвали Бестарен, те го определят като **бързо и ефективно аналгетично средство**.¹

Болката е най-честата причина за консултация в центровете за първична медицинска помощ, а НСПВС са средство на първи избор за лечение на лека до умерена болка.⁸

Промяна на тежестта на болката в процеса на лечение спрямо началото чрез CGI (Clinical Global Impression Scale) Rey-Mattias et al.2018



Подобрене се наблюдава при **86.8%** от пациентите с различни болкови състояния, лекувани с декскетопрофен. Не са описани случаи на влошаване.⁸

НИСКА ЧЕСТОТА НА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ³

Декскетопрофен демонстрира сигнификантно подобрение в оценката на болката при пациенти с болка от различен произход, съчетано с ниска честота на нежелани реакции ($p < 0,0001$).⁸

Честота на проява и видове нежелани събития при пациенти лекувани с декскетопрофен

Rey-Mattias et al.2018

Пациенти с болка от различен произход, включени в проучването - N	870
Подуване на корема	1
Констипация	1
Замайване	4
Болки в стомашната област	5
Повишена температура	1
Хипергликемия	1
Хипертония	1
Инсомния	1
Гадене	1
Периорбитален оток	1
Сърбеж	1
Безпокойство	1
Некласифицирани	5
Пациенти с поне едно нежелано събитие (n)	24 (2,8%)

Ниска честота - от общо 870 пациенти, лекувани с декскетопрофен за болка от различен произход, 24 пациенти (2.8%) са имали поне едно нежелано събитие. В повечето случаи тези събития не са повлияли на ежедневните дейности на пациентите.⁸



ПРОТИВОБОЛКОВО СРЕДСТВО НА ПЪРВИ ИЗБОР

- ▶ Характеризира се с бързо настъпваща аналгезия, мощно противовъзпалително действие и редуцирана честота на нежелани реакции.²
- ▶ Намалява интензитета на болката и степента на инвалидизация. Способства по-бързото възстановяване на пълната физическа активност.⁴
- ▶ Ефективно, бързодействащо аналгетично средство.⁵

КЛИНИЧНИ ДАННИ¹⁰

Терапевтични показания

Симптоматично лечение на лека до умерена болка, напр. в мускулно-скелетната система, при дисменорея и зъбобол.

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

В зависимост от вида и интензитета на болката, препоръчителната доза е 12,5 mg на интервали 4-6 часа или 25 mg на всеки 8 часа. Общата дневна доза не трябва да надвишава 75 mg.

Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат намалени като за контролиране на симптомите се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време (вж. точка 4.4).

Бестарен не е предназначен за продължително приложение и лечението трябва да се ограничи в симптоматичния период.

Едновременното приложение с храна забавя скоростта на резорбция на лекарството (вж. "Фармакокинетични свойства") и затова в случай на остра болка се препоръчва да се прилага поне 30 минути преди хранене.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст се препоръчва лечението да започне с по-ниска доза в определените граници на дозировката (обща дневна доза 50 mg). Дозата може да се увеличи до препоръчителната за общата популация само след установяване на добра обща поносимост.

Нарушена чернодробна функция

Пациенти с леко до умерено нарушена чернодробна функция трябва да започнат лечението с намалени дози (обща дневна доза 50 mg) и да се проследяват внимателно. Бестарен не трябва да се използва при пациенти с тежко нарушена чернодробна функция.

Нарушена бъбречна функция

При пациенти с леко нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс 50-80 ml/min), началната доза трябва да се намали до 50 mg обща дневна доза (вж. точка 4.4). Бестарен не трябва да се използва при пациенти с умерено до тежко нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс <50 ml/min) (вж. точка 4.3).

Деца и юноши

Бестарен не е проучен при деца и юноши. Тъй като безопасността и ефикасността не е проучена, продуктът не трябва да се прилага при деца и юноши.

Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта (КХП), одобрена на 09.02.2024г.

REFERENCES:

1. Удовлетвореност от лечението с генеричен декскетопрофен Бестарен®, прилаган при пациенти с ноцицептивна болка. Обобщени резултати от анкетно проучване на мнението на лекари от различни специалности. Accessed June 24, 2024. <https://medinfo.bg/spisanie/2020>
2. Jiménez-Martínez E, Gasco-García C, Arrieta-Blanco JJ, Gomez del Torno J, Bartolome Villar B. Study of the analgesic efficacy of Dexketoprofen Trometamol 25mg. vs. Ibuprofen 600mg. after their administration in patients subjected to oral surgery. Med Oral. 2004;9(2):143-148, 138-143.
3. Gaskell H, Derry S, Wiffen PJ, Moore RA. Single dose oral ketoprofen or dexketoprofen for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017;5(5):CD007355. doi:10.1002/14651858.CD007355.pub3
4. Leman P, Kapadia Y, Herington J. Randomised controlled trial of the onset of analgesic efficacy of dexketoprofen and diclofenac in lower limb injury. Emerg Med J. 2003;20(6):511-513. doi:10.1136/emj.20.6.511
5. Carne X, Rios J, Torres F. Postmarketing cohort study to assess the safety profile of oral dexketoprofen trometamol for mild to moderate acute pain treatment in primary care. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2009;31(8):533-540. doi:10.1358/mf.2009.31.8.1419070
6. Brzeziński K, Wordliczek J. Comparison of the efficacy of dexketoprofen and diclofenac in treatment of non-specific low back pain. Ann Agric Environ Med. 2013;Spec no. 1:52-56.
7. Barbanoj MJ, Antonijoan RM, Gich I. Clinical pharmacokinetics of dexketoprofen. Clin Pharmacokinet. 2001;40(4):245-262. doi:10.2165/00003088-200140040-00002
8. Matias RRR, Leochico CFD, Nilo GS. Effectiveness and Safety of Oral Dexketoprofen for Mild to Moderate Pain among Filipino Adults: A Post-marketing Surveillance Study. Accessed June 24, 2024.
9. КХП – Профенуг
10. КХП – Бестарен

Притежател на разрешението за употреба: „Беста Мег ЕООД“, ул. „Кънчо Скорчев“ № 8, 5350 Трявна, България. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа 36,9 mg декскетопрофен трометамол, еквивалентно на 25 mg декскетопрофен. № ИАЛ: 40176/12.09.2024 г