

Сигнификантно по-добър  
контрол на болката и  
отока с ибупрофен  
L-аргинин при пациенти  
след хирургична  
екстракция на мъдрец<sup>1</sup>



**Болката не пита!**

**Попитай за Оклис®!**

Ибупрофен **L-аргинин**

[www.oklys.bg](http://www.oklys.bg)


Бързодействащите форми на ибупрофен като ибупрофен L-аргинин показват ускорена абсорбция, по-бързо първоначално намаляване на болката, добра цялостна аналгезия при повече пациенти със същата доза и вероятно по-дълготрайна аналгезия, но без по-висок процент пациенти с нежелани събития.<sup>2</sup>



- Сигнификантно по-добър контрол на болката и отока с ибупрофен L-аргинин при пациенти след хирургична екстракция на мъдрец<sup>1</sup>


## L-аргинин подобрява противовъзпалителните свойства на ибупрофен<sup>1</sup>

### БОЛКА / $p < 0.05$





**ОТОК /  $p < 0.05$**



**Ибупрофен L-аргинин 600mg води до по-добро заздравяване на меките тъкани след операция на ретиниран мъдрец<sup>1</sup>**

## Клинични данни<sup>3</sup>

### ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- Лечение на мускулни (навяхвания и разтежения) и костни заболявания с болка и възпаление.
- Лечение на зъбобол, следоперативна болка, лека до умерена болка и симптоматично лечение на главоболие.
- Лечение на ревматоиден артрит (включително ювенилен ревматоиден артрит), анкилозиращ спондилит, артроза и други остри или хронични ревматични процеси, меки тъкани при навяхвания и разтежения.
- Симптоматично лечение на висока температура при симптоми на висока температура с различна етиология.
- Симптоматично облекчаване на болка, висока температура и възпаления, които съпътстват състояния като фарингит, тонзилит, ушни инфекции и др.
- Облекчаване симптомите при първична дисменорея.

### ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При **ревматоиден артрит** могат да са необходими по-големи дози, но във всеки случай е препоръчително да не се надвишава максималната дневна доза от 2400 mg ибупрофен.

При **възпалителни процеси** препоръчителната дневна доза е 1200-1800 mg ибупрофен, която се приема няколко пъти през деня. Поддържащата доза обикновено е 800-1200 mg. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 2400 mg.

При **болезнени процеси** със слаб до умерен интензитет и при симптоми на висока температура препоръчителната дневна доза е 800-1600 mg, която се приема няколко пъти през деня, в зависимост от интензитета на симптомите и отговора на лечението.

**Деца:** Употребата на Оклис и Оклис Форте гранули за перорален разтвор не се препоръчва при деца под 14 години, тъй като дозата ибупрофен, която се съдържа, не е подходяща дозировка за деца.

### НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Перорален прием. Съдържанието на сашето се изсипва в половин чаша вода и се разбърква интензивно.

Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта (КХП).

### Референции:

1. Ramos EU, Benetti LP, Oliviera JCS, Farnezi Bassi AP. Single-Dose Ibuprofen-Arginine as a Preventive for Pain, Edema, and Trismus After Impacted Lower Third Molar Surgery: A Randomized Split-Mouth Clinical Trial. Eur J Dent 2022;16:396–402.

2. Moore AR, Derry SH al. Faster, higher, stronger? Evidence for formulation and efficacy for ibuprofen in acute pain. Pain. 2014 Jan;155(1):14-21. doi: 10.1016/j.pain.2013.08.013.

3. КХП Оклис.

Притежател на разрешението за употреба „Беста Мег“ ЕООД, ул. „Кънчо Скорчев“ №8, 5350 Трявна, България.

Оклис, Оклис Форте, лекарствени продукти без лекарско предписание за лица над 14 години. Съдържат ибупрофен. № ИАЛ 34906/08.08.2024